

FIEBRE AMARILLA

La fiebre amarilla es una enfermedad aguda, infecciosa, producida por un virus perteneciente al género Flavivirus. El hombre contrae la infección como consecuencia de la picadura de un mosquito infectado, el cual pertenece al género *Aedes aegypti*. Los virus son inyectados a nivel del tejido celular subcutáneo y, luego de reproducirse localmente, se diseminan por todo el organismo al alcanzar el sistema circulatorio.

En América, la infección se encuentra controlada gracias a los esfuerzos realizados para erradicar a los mosquitos y con el desarrollo de una vacuna; aunque en algunas regiones selváticas se han registrados algunos casos.



¿Quiénes no deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

- Las personas que alguna vez tuvieron una reacción alérgica que puso en peligro su vida a: huevos, pollo, gelatina o a una vacuna anterior contra la fiebre amarilla.
- Los bebés menores de 9 meses de edad. En el caso de bebés de 6 a 8 meses de edad que no pueden evitar viajar a una zona de fiebre amarilla, hable con su médico sobre la vacunación. En ninguna circunstancia se debe vacunar a los bebés menores de 6 meses de edad.
- Las mujeres embarazadas y las madres que estén amamantando deben evitar o aplazar el viaje a zonas de fiebre amarilla. Si el viaje es inevitable, hable con su médico sobre la vacunación.

¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

- Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a, o viven en, un país que requiere que ciertos viajeros se vacunen contra la fiebre amarilla. Consulte a su proveedor de salud.
- Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a un país que no requiera la vacunación contra la fiebre amarilla pero que está ubicado en una zona donde se sabe que existe el riesgo de la fiebre amarilla. Consulte a su proveedor de salud.
- Si sigue viviendo en, o viajando a, lugares en los que la fiebre amarilla es endémica, debe recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla después de 10 años.
- La vacuna contra la fiebre amarilla se puede dar al mismo tiempo que la mayoría de las demás vacunas.

Consulte a su médico antes de vacunarse contra la fiebre amarilla si:

1. Ha tenido en el pasado alergia a los huevos, el pollo, o la gelatina.
2. Tiene VIH/SIDA o alguna otra enfermedad que afecte el sistema inmunológico.
3. Ha estado bajo tratamiento por 2 semanas o más con medicamentos que afectan el sistema inmunológico, tales como esteroides.
4. Tiene algún tipo de cáncer.
5. Le están haciendo tratamiento contra el cáncer con rayos X o con medicamentos.
6. Le sacaron la glándula timo o ha tenido problemas con el timo, tales como miastenia gravis, síndrome del DiGeorge, o timoma.



Si tiene 65 años de edad o más, hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de la vacunación, comparados con su riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla en el lugar al que viajará.

Si por algún motivo médico no se puede vacunar y el lugar al que viajará requiere prueba de vacunación contra la fiebre amarilla, su médico le puede dar una carta de exención. La misma se puede obtener presentando certificado médico que acredita el diagnóstico que justifica la exención y se debe concurrir con DNI o PASAPORTE sin excepción.



Lugares de vacunación

Córdoba

Sanidad de Fronteras

(Sanidad de Fronteras Córdoba del Ministerio de Salud de la Nación).
Horario: martes, miércoles y jueves de 12:30 a 13:00 hs.
Dirección: Calle 9 de Julio 356.

Rosario

Unidad Sanidad de Fronteras

Av. Belgrano 836, Rosario.
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 hs.
Tel.: 0341- 4484971

Buenos Aires

Dirección de Sanidad de Fronteras

(Se aplica de manera gratuita)
Dirección: Avda. Ingeniero Huergo 690. Cap. Fed
TEL: 4343-1190/ 4334-1875.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Dr. Stambouljian TEL: 4515-3000
www.drstambouljian.com.ar